

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑨日本国特許庁
公開特許公報

⑩特許出願公開
昭53-86033

⑪Int. Cl.² 識別記号 ⑫日本分類 庁内整理番号 ⑬公開 昭和53年(1978)7月29日
A 01 N 9/12 30 F 371.221 6516-49
A 01 N 9/22 30 F 932 7349-49 発明の数 1
審査請求 未請求

(全 12 頁)

⑭除草剤

①特 願 昭52-126454

②出 願 昭49(1974)9月4日

(手続補正書提出の日)

②発 明 者 行永寿二郎

草津市草津2の4の41

同 炭本信三郎

大阪市東住吉区湯里町2の126

②発 明 者 石塚一郎

大阪府豊能郡東能勢村大字吉川
15の542

同 杉田実男

池田市畑町619の6

④出 願 人 塩野義製薬株式会社

大阪市東区道修町3丁目12番地

④代 理 人 弁理士 岩崎光隆


明 細 書

1. 発明の名称

除草剤

2. 特許請求の範囲

一般式




(式中、Rは水素、アルキル基(シクロアルキル基を含む、以下同様)またはアリール基；R'は水素またはアルキル基；R²はアシル基、-CON< $\begin{array}{c} \text{R}^2 \\ \text{R}^2 \end{array}$ で表わされる基(ただし、R²およびR²は各々水素、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アリール基、アルキルチオ基またはアルコキシ基を表わすか、あるいはR²およびR²は互いに直接もしくはヘテロ原子を介して結合し、含窒素環を形成してもよい。)または-COYR²で表わされる基(ただし、R²はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基またはアリール基、Yは酸素または硫黄を表わす。)、Xは水素、アルキル基またはハロゲンを表わす、ただし、

RとXとは互いに連結してアルキレン基を形成してもよく、また、R、R'、R²、R²、R²またはR²で表わされる各炭化水素基上にはアルキル基、アルコキシ基、水酸基、ニトロ基、シアノ基およびハロゲンから選ばれた1種以上の置換基が存在してもよい。)

で示される化合物1種以上を有効成分として含有する除草剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は一般式



(式中、Rは水素、アルキル基またはアリール基；R'は水素またはアルキル基；R²はアシル基、CON< $\begin{array}{c} \text{R}^2 \\ \text{R}^2 \end{array}$ で表わされる基(ただし、R²およびR²は各々水素、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アリール基、アルキルチオ基またはアルコキシ基を表わすか、あるいはR²およびR²は互いに直接もしくはヘテロ原子を介して結合し、含窒素環を形成してもよい。)または-COYR²で表

わされる基(ただし、R'はアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基またはアリーニル基、Yは酸素または硫黄を表わす。)、Xは水素、アルキル基またはハロゲンを表わす。ただしRとXは互いに結合してアルキレン基を形成してもよく、またR、R'、R²、R³、R⁴またはR⁵で表わされる各炭化水素基上にはアルキル基、アルコキシ基、水酸基、ニトロ基、シアノ基およびハロゲンから選ばれた1種以上の置換基が存在してもよい。)で示される化合物の1種以上を有効成分として含有する除草剤に関する。


なお、上述の用語についてさらに説明を補足すれば、アルキル基としてはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、i-ブチル、シクロプロピル、シクロヘキシルなどが、アリーニル基としてはフェニル、トリル、メトキシフェニル、ハロゲンフェニルなどが、アルケニル基としてはビニル、アリル、ブテニル、ブタジエニル、シクロヘキセニルなどが、アルキニル基としてはエチニル、プロピニル、ブチリルなどが、アラルキル基として

はベンジル、フェネチル、クロロベンジルなどが、アルキレン基としてはテトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレンなどが、アルコキシ基としてはメトキシ、エトキシ、プロポキシなどが、アルキルチオ基としてはメチルチオ、エチルチオ、プロピルチオなどが、アシル基としてはホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソバレリル、ピバロイル、アクリロイル、メタクリロイル、クロトノイル、ベンゾイル、トルロイル、ナフトイル、シンナモイル、フロイル、キノイル、ニコチノイル、シクロヘキサンカルボニルなどが、ハロゲンとしては塩素、臭素、ヨウ素などが、それぞれ例示され得るが、本発明の目的上これらは上記具体例のみに限定されるものではない。


本発明者らは各種イソオキサゾール誘導体の除草作用について詳細な研究を行なった結果、前記イソオキサゾール化合物(I)が優れた除草効果を有するとともに人畜魚類などには極めて毒性が低く、しかも土壌中における変性分解能が過度であることを見出し、本発明を完成した。

本発明にかかるイソオキサゾール化合物(I)は9種の化合物Ia、Ib、Ic、Id、Ie、If、Ig、IhおよびIiを包含し、それぞれ下記の反応式で示されるように合成することができる。


第1工法




第2工法



第3工法




第4工法




第5工法




第6工法




第7工法




第8工法




第9工法



第10工法



第11工法



(式中、Aは反応性残基(例えば、ハロゲン、エステル残基)を被らし、R、R'、R²、R³、R⁴、R⁵、XおよびYは前記と同意義を有する。)

以下に各工法についての具体的な合成例を示す。

合成例1

3-アミノ-5-*m*-*tert*-ブチルイソキサゾール1682gを無水ベンゼン140mlに溶解し、これにかきまぜながらイソシアン酸メチルエステル890gおよびトリエチルアミン0.5mlを加え、混合物を室温下で約8時間かきまぜ、一夜放置し、次に1時間加熱還流させる。水冷後、反応液より析出した結晶を取り、それを酢酸エチルより再結晶し、融点182.0~182.5℃の無色針状晶として1-メチル-3-(5-*m*-*tert*-ブチル-3-イソキサゾール)尿素2161gを得る。

り析出した結晶を取り、それを酢酸エチルより再結晶し、融点182.0~182.5℃の無色針状晶として1-メチル-3-(5-*m*-*tert*-ブチル-3-イソキサゾール)尿素2161gを得る。

合成例2~65

下記の原料物質(II)を使用し、合成例1と同様に反応を行い、対応する目的物質(Ia)を得る:




表1

合成例系	II		III		目的物質(Ia) mp, bp, または I, R
	R	X	R'	R ³	
2	H	H	H	Me	165.5-166.0
3	Me	H	H	Me	214.0-215.0
4	Et	H	H	Me	157.5-159.0
5	Pr	H	H	Me	155.0-156.0
6	<i>i</i> -Pr	H	H	Me	112.0-113.0
7	<i>C</i> -Pr	H	H	Me	157.0-158.0
8	Ph	H	H	Me	195.5-196.0

9	-(CH ₂) ₄ -	H	Me	193.0-194.0
10	Me	H	Et	133.0-134.5
11	<i>i</i> -Pr	H	Et	122.5-123.5
12	<i>t</i> -Bu	H	Et	179.0-180.5
13	Me	H	Pr	95.0-96.7
14	<i>i</i> -Pr	H	Pr	88.5-89.5
15	<i>t</i> -Bu	H	Pr	134.0-135.0
16	Me	H	<i>i</i> -Pr	118.0-119.0
17	<i>i</i> -Pr	H	<i>i</i> -Pr	115.0-116.0
18	<i>t</i> -Bu	H	<i>i</i> -Pr	134.0-135.0
19	Me	H	Bu	89.5-90.5
20	<i>i</i> -Pr	H	Bu	71.0-72.0
21	<i>t</i> -Bu	H	Bu	69.5-71.5
22	Me	H	Al	110.0-111.0
23	<i>i</i> -Pr	H	Al	81.5-82.5
24	<i>t</i> -Bu	H	Al	130.0-131.0
25	Me	H	<i>C</i> -He	164.0-165.0
26	<i>i</i> -Pr	H	<i>C</i> -He	161.5-163.5
27	<i>t</i> -Bu	H	<i>C</i> -He	193.5-195.0
28	H	H	Ph	187.0-188.5
29	Me	H	Ph	188.0-189.0
30	Et	H	Ph	157.0-158.5
31	Pr	H	Ph	160.0-161.0
32	<i>i</i> -Pr	H	Ph	178.0-179.0

33	<i>t</i> -Bu	H	H	Ph	198.5-199.5
34	<i>C</i> -Pr	H	H	Ph	158.5-160.0
35	Ph	H	H	Ph	210.5-211.5(d)
36	-(CH ₂) ₆ -	H	H	Ph	187.0-188.0
37	Me	H	H	<i>m</i> -Tol	169.5-170.0
38	<i>i</i> -Pr	H	H	<i>m</i> -Tol	164.5-166.0
39	<i>t</i> -Bu	H	H	<i>m</i> -Tol	188.5-190.0(d)
40	Me	H	H	<i>p</i> -Cl-Ph	205.5-207.0(d)
41	<i>i</i> -Pr	H	H	<i>p</i> -Cl-Ph	174.0-175.0
42	<i>t</i> -Bu	H	H	<i>p</i> -Cl-Ph	188.5-190.0(d)
43	Me	H	H	<i>p</i> -Br-Ph	201.5-203.0(d)
44	<i>i</i> -Pr	H	H	<i>p</i> -Br-Ph	176.0-177.0(d)
45	<i>t</i> -Bu	H	H	<i>p</i> -Br-Ph	192.5(d)
46	H	H	Me	Me	63.0-64.0
47	Me	H	Me	Me	77.0-78.0
48	Et	H	Me	Me	74.0-75.0
49	Pr	H	Me	Me	45.0-46.0
50	<i>i</i> -Pr	H	Me	Me	77.5-78.5
51	<i>C</i> -Pr	H	Me	Me	67.0-68.0
52	<i>t</i> -Bu	H	Me	Me	150.0-151.0
53	Ph	H	Me	Me	132.0-133.0
54	-(CH ₂) ₄ -	Me	Me		82.5-83.5
55	<i>t</i> -Bu	H	Me	34- C ₆ H ₅ -Ph	128.5-129.5

56	i-Bu	Cl	Me	Me	155.0-156.0
57	Me	H	Et	Me	37.0-38.0
58	i-Bu	H	Me	Bu	169.0, 160.7 μ m ⁻¹ (CCl ₄)
59	i-Bu	H	H	Me	148.5-149.5
60	i-Bu	H	Me	Me	123-125°C/0.66mmHg
61	i-Bu	H	Me	Al	139-141°C/0.69mmHg
62	i-Bu	H	Me	Al	126-128°C/0.45mmHg
63	i-Bu	H	Et	Me	106.5-107.5
64	i-Bu	H	Me	Et	168.3, 160.3 μ m ⁻¹ (CCl ₄)
65	i-Bu	Br	H	Me	160.5-161.0

注) 上記表中の略号は下記の意味を有する:

H (水素), Me (メチル基), Et (エチル基),
Pr (プロピル基), Bu (ブチル基), Ph (フ
エニル基), Al (アリル基), He (ヘキシル基),
Tol (トリル基), C- (シクロ-), i- (イソ
-), t- (ターシャリ-), m- (メタ-),
p- (パラ-), d (分解点), mp (融点, °C),
bp (沸点), I. R. (赤外線吸収スペクトル).

合成例 66

3-アミノ-5-シクロプロピルイソキサゾ
ール 1.74g をベンゼン 20 ml に懸濁し、室温下
かきまぜながらこれにクロル炭酸イソプロピルエ

ステル 2.06g を 5~10 分間かけて滴下する。
氷冷下ピリジン 1.22g を加え、30 分間かきま
ぜたのち、全体を室温下一夜放置する。冷後、反
応液に水 20 ml を加え、ベンゼン 10 ml で抽出す
る。水層をさらにベンゼン 20 ml で抽出し、ベン
ゼン抽出液を合体させる。このベンゼン溶液は水
20 ml で 3 回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥
したのち、ベンゼンを留去する。得られる淡褐色
粗結晶 2.97g をヘキサンより再結晶し、融点
64.5~65.5°C の微黄色プリズム晶として N-
(5-シクロプロピル-3-イソオキサゾリル)
カルバミン酸メチルエステルを得る。収率 92.9
%。

合成例 67-83

下記の原料物質 (II) を使用し、合成例 66 と
同様に反応を行い、対応する目的物質 (Id) を得
る:




表 2

合成 例 No.	II			目的物質 (Id)	
	R	X	R'	R'	mp, bp, または I. R.
67	Me	H	H	Me	136.0-137.0
68	Et	H	H	Me	83.0-84.0
69	Pr	H	H	Me	66.0-67.0
70	i-Pr	H	H	Me	74.0-75.0
71	i-Bu	H	H	Me	57.5-58.5
72	H	H	H	i-Pr	87.5-89.0
73	Me	H	H	i-Pr	82.0-82.5
74	i-Pr	H	H	i-Pr	56.0-58.0
75	i-Bu	H	H	i-Pr	83.0-83.5
76	Ph	H	H	i-Pr	103.5-104.5
77	-(CH ₂) ₄ -	H	H	i-Pr	129.0-130.0
78	C-Pr	H	H	Me	101.5-102.5
79	Me	H	Me	Me	85-95°C (浴温), 0.80mmHg
80	i-Bu	H	H	Me	76.0-77.0
81	i-Bu	H	H	Et	51.0-52.0
82	H	H	H	Me	12.4-12.5
83	i-Bu	H	Me	Me	84.0-87.0°C, 0.55mmHg

注) 表中の略号は前記と同意義を有する。

合成例 84

3-アミノ-5-メチルイソキサゾール 1.962
g にジロ炭酸ジメチルエステル 2.816g を室温
下にかきまぜながら滴下すると、原料結晶は発泡
しつつ溶解する。全体を微加温すると発熱して反
応する。反応液を 2 時間放置し、冷時析出した結
晶を取り出し、メタノール 15 ml で洗滌し、粗結晶
1.731g を得る。母液と洗滌液を合わせて減圧濃
縮し、得られる二倍結晶を水 40 ml で洗滌し、追
加の粗結晶 1.56g が得られる。両粗結晶を合わ
せ、メタノール 44 ml より再結晶し、融点 136.0
~137.0°C の精製化結晶として N-(5-メチ
ル-3-イソオキサゾリル)カルバミン酸メチ
ルエステル 1.470g を得る。

合成例 85

3-アミノ-5-イソブチルイソキサゾール
2.80g にジロ炭酸ジメチルエステル 4.02g を
加え、室温下に 1 時間 40 分をかきまぜ、次いで
65°C にて 3 時間かきまぜる。さらにジロ炭酸ジ
メチルエステル 1.34g を加え、65°C にて 1 時間

かきまぜる。反応液を室温まで冷却し、一夜放置する。これを減圧濃縮し、析出する結晶4.02gをヘキサンより再結晶し、融点55.5~58.5℃の結晶としてN-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)カルバミン酸メチルエステルを得る。

合成例86

3-アミノ-5-メチルイソオキサゾール0.49gに炭酸ジメチルエステル2.38gおよびナトリウムメトキシド0.30gを加え、100℃で3時間かきまぜる。冷後、反応液に水15mlを加え、少量の炭塩酸で全体を出しとし、酢酸エチルで2回抽出する。酢酸エチル層は水洗し、無水芒硝で乾燥し、溶媒を留去し、淡黄色結晶0.52gを得る。本品をシリカゲルのカラムクロマトグラフィーに付して精製し、融点57.5~58.5℃の結晶としてN-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)カルバミン酸メチルエステルを得る。


合成例87

イソシアン酸5-メチル-3-イソオキサゾリルエステル1.99gをベンゼン120mlに懸

濁させ、これにN-メチルブチルアミン1.15gを加え、3時間還流させる。冷後、反応液から溶媒を留去し、残渣をシリカゲルの薄層クロマトグラフィーに付し、1-ブチル-1-メチル-3-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)尿素2.73gを得る。本品はヘキサンより再結晶し、融点65.5~66.5℃の結晶を得る。収率89.8%。

合成例88-157

下記の原料物質(N)を使用し、合成例87と同様に反応を行い、対応する目的物質(Ib)を得る：



(以下余白)

表3

合成例	II		目的物質 (Ib)		
	R	X	R ^j	R ^k	mp, bp, 又は I, R.
88	t-Bu	H	Me	Me	119.5-120.5
89	Me	H	H	H	201-203(d)
90	t-Bu	H	H	H	179.5-180.5
91	Me	H	Me	Me	150.5-151.5
92	t-Bu	H	Me	Al	900-910
93	t-Bu	H	Me	Me t	1060-1070
94	Me	H	-CH ₂ CH ₂ - -CH ₂ CH ₂ -O		1700-1710
95	i-Pr	H	Me	Me	69.0-70.0
96	t-Bu	H	Me	Me	90.5-91.0
97	i-Pr	H	Me	Bu	1680.1616cm ⁻¹ (CCl ₄)
98	i-Bu	H	Me	Bu	1678.1620cm ⁻¹ (CCl ₄)
99	t-Bu	H	Me	Et	88.5-89.5
100	t-Bu	H	Et	Et	122.0-123.5
101	t-Bu	H	Pr	Pr	75.0-80.5
102	t-Bu	H	i-Pr	i-Pr	200-205(d)
103	t-Bu	H	Et	Bu	1677.1612cm ⁻¹ (CCl ₄)
104	t-Bu	H	Me	C-H	149.5-150.5
105	t-Bu	H	Me	Ph	122.5-123.0
106	t-Bu	H	Me	Bz	107.0-108.0

107	t-Bu	H	Al	Al	1676.1610cm ⁻¹ (CCl ₄)
108	t-Bu	H	Bu	Bu	1676.1611cm ⁻¹ (CCl ₄)
109	t-Bu	H	i-Bu	i-Bu	1120-1130
110	Me	H	Me	Bu	79.0-80.0
111	Me	H	Me	Al	89.0-90.0
112	Me	H	Me	Me t	91.0-92.0
113	Me	H	H	o-F-Ph	1700-171.0
114	Me	H	H	34-Cl ₂ -Ph	2080-2090
115	Me	H	H	p-NO ₂ -Ph	253-254(d)
116	Me	H	-(CH ₂) ₆ -		1930-1940
117	Me	H	-(CH ₂) ₈ -		1590-1600
118	Et	H	Me	Me	86.5-87.5
119	Et	H	Me	Bu	1682.1624cm ⁻¹ (CCl ₄)
120	Et	H	Me	Al	46.5-47.5
121	Et	H	Me	Me t	67.0-68.0
122	Et	H	(CH ₂) ₂ (XCH ₂) ₂ -		121.5-122.0
123	Pr	H	Me	Me	88.0-89.0
124	Pr	H	Me	Bu	1680.1622cm ⁻¹ (CCl ₄)
125	Pr	H	Me	Al	55.0-57.0
126	Pr	H	Me	Me t	64.0-65.0
127	Pr	H	(CH ₂) ₂ (XCH ₂) ₂ -		108.5-109.0
128	i-Pr	H	Me	Al	55.5-56.5
129	i-Pr	H	Me	Me t	54.4-55.5
130	i-Pr	H	(CH ₂) ₂ (XCH ₂) ₂ -		130.5-131.5

131	i-Bu	H	Me	Al	255-270
132	i-Bu	H	Me	Met	820-830
133	i-Bu	H	$-(CH_2)_2O(CH_2)_2-$		1095-1105
134	t-Bu	H	H	s-Bu	1325-1340
135	t-Bu	H	H	i-Bu	1215-1220
136	t-Bu	H	H	t-Bu	1805-1835
137	t-Bu	H	H	34-Cl ₂ -Ph	2265-2270
138	t-Bu	H	H	Bz	1365-1375
139	t-Bu	H	H	α -Me-Bz	1180-1190
140	t-Bu	H	Me	Pr	760-770
141	t-Bu	H	Me	i-Pr	905-915
142	t-Bu	H	Me	s-Bu	1135-1145
143	t-Bu	H	Me	i-Bu	1135-1145
144	t-Bu	H	Me	t-Bu	1490-1510
145	t-Bu	H	Me	He	1679.1615 ^{mm} (CCl ₄)
146	t-Bu	H	Me	α -Me-Bz	1210-1220
147	C-Pr	H	Me	Me	1450-1460
148	C-Pr	H	Me	Met	775-785
149	Ph	H	Me	Me	1830-1850
150	Ph	H	Me	Met	1280-1290
151	$-(CH_2)_6-$	Me	Me		1645-1655
152	$-(CH_2)_6-$	Me	Met		1115-1120
153	t-Bu	H	$-(CH_2)_6-$		1320-1375

154	t-Bu	H	$-(CH_2)_3-$	1140-1150
155	t-Bu	H	$-(CH_2)_2O(CH_2)_2-$	1790-1800

注) 表中の略号は下記の意義を有する:

Met (メトキシ基), Bz (ベンジル基),

s- (セカンダリー), その他は前記と同義

義を有する。

合成例 156-166

イソシアン酸 5-メチル-3-イソオキサゾリ
ンエステル 1719 をベンゼン 46 ml に懸濁させ
これにアリルアルコール 0.88 g を加え、3 時間
還流させる。冷後、反応液から溶媒を留去し、N-
(5-メチル-3-イソオキサゾリル) カルバ
ミン酸アリルエステル 2389 を得る。本品をシ
クロヘキサンより再結晶すると融点 76.5~77.5
°C の結晶を得る。

下記の原料物質 (N) を使用し、上記と同様に
反応を行い、対応する目的物質 (I^a) を得る:




表 4

合成 例	N			目的物質 (I ^a)	
	R	X	Y	R ²	mp, bp または l. R.
157	t-Bu	H	O	$-CH_2C\equiv CH$	1265-1275
158	t-Bu	H	S	Me	1155-1165
159	t-Bu	H	S	Ph	1540-1550
160	t-Bu	H	O	$-CH_2CCl_2$	1515-1525
161	t-Bu	H	O	$-CH_2CH=CH_2$	640-650
162	t-Bu	H	O	Pr	875-885
163	t-Bu	H	O	$-CH_2CH_2OH$	1740.1611 ^{mm} (CCl ₄)
164	t-Bu	H	O	$-CH_2CH_2OCH_3$	49-51
165	t-Bu	H	O	α,α -Me ₂ -Bz	1260-1280
166	t-Bu	H	O	$-CH_2CF_3$	1250-1260

注) 略号は前記と同義義を有する。

合成例 167

無水メタノール 45 ml にナトリウム 1.57 g を
加えてナトリウムメトキシとし、N-(5-
-フタル-3-イソオキサゾリル) カルバミン酸
メチルエステル 1288 g を加え、室温下 10 分
間かき混ぜたのち、メタノールを減圧留去する。
残液に無水ベンゼン 100 ml を加え、硫酸ジメチ

ル 8.6 g を添加し、1 時間かき混ぜたのち、さ
らに 1 時間還流する。冷後、不溶物を留去し、ベ
ンゼン溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液およ
び水で順次洗滌し、無水芒硝上で乾燥し、溶媒を
留去する。残液を蒸留し、沸点 84.0~87.0°C
/ 0.55 mm の留出物として N-メチル-N-(
5-(1-フタル-3-イソオキサゾリル) カルバ
ミン酸メチルエステル 1145 g を得る。

(以下余白)

合成例 / 68 - 170

合成例 / 67 と同様に反応を行い、下記の目的物質を得る：




表 5

合成例	目的物質 (1f)				
	R	X	R'	R ²	mp, bp または l. R
168	C-Pr	H	Me	-COOCH ₃	96-97.5°C/0.5mmHg
169	i-Bu	H	Me	-COCH ₃	98-100°C/0.42mmHg
170	Me	Cl	Me	-COCH ₃	82.8°C(浴温)/0.36mmHg

注) 略号は前記と同意義を有する。

合成例 / 71

1,1-ジメチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素 / 0.99g を乾燥したジメチルホルムアミド / 10 ml に溶解し、室温下にかきまぜつつ 5.0% 水酸化ナトリウム 2.75g を加え、60°C で 15 分間加熱する。10°C に冷却しヨウ化メチル 8.86g を乾燥したジメチルホルムアミド 30 ml に溶かした溶液を加え、1 時間で滴

177	C-Pr	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	1300-1310°C/0.58mmHg
178	Ph	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	1681-1623°C (CCl ₄)

注) 略号は前記と同意義を有する。

合成例 / 79

合成例 / 71 と同様に反応処理し、1-(5-メチル-3-イソキサゾリル)尿素から融点 72.0~78.0°C の結晶として 1,3-ジメチル-3-(5-メチル-3-イソキサゾリル)尿素 2.1% および融点 146.0~147.0°C の結晶として 1-メチル-1-(5-メチル-3-イソキサゾリル)尿素 48.5% を得る。さらに融点 55.0~56.0°C の結晶として 3-メチルアミノ-5-メチルイソキサゾール / 7.7% を副生する。

合成例 / 80

合成例 / 71 と同様に反応処理し、1-(5-イソキサゾリル)尿素から、融点 90.0~91.0°C の結晶として 1,1,3-トリメチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素 5.61%、融点 150.0~151.0

下し、80°C で 5 分間加熱し、溶媒を留去する。残渣に水 / 50 ml を加え、クロロホルムで抽出する。クロロホルム層を無水芒硝で乾燥し、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィーに付し、融点 90~91.0°C の結晶として 1,1,3-トリメチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素 / 0.94g を得る。収率 93.38%。

合成例 / 72 - 178

合成例 / 71 と同様に反応を行い、下記の目的物質 (1f) を得る：




表 6

合成例	目的物質				
	R	X	R'	R ²	mp, bp または l. R
172	Me	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	105-108°C(浴温)/10.48mmHg
173	Et	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	1130-1140°C/0.86mmHg
174	Pr	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	1150-1160°C/0.60mmHg
175	i-Pr	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	1060-1070°C/0.30mmHg
176	i-Bu	H	Me	-CON(CH ₃) ₂	1230-1240°C/0.54mmHg

°C の結晶として 1,3-ジメチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素を 7.24% 収率で、さらに融点 134.0~135.0°C の結晶として 1-メチル-1-(5-イソキサゾリル)尿素を 46.97% 収率で得る。他に融点 83°C / 0.71mmHg 程度の留出物として 3-メチルアミノ-5-イソキサゾール / 4.30% 相当を副生する。

合成例 / 81

合成例 / 71 と同様に反応処理し、1-メチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素から融点 150~151.0°C の結晶として 1,3-ジメチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素を収率 / 6.3% 相当で、さらに融点 90.0~91.0°C の結晶として 1,1,3-トリメチル-3-(5-イソキサゾリル)尿素を 3.39% 収率で得る。

合成例 / 82

1-メチル-3-(5-メチル-3-イソキサゾリル)尿素を使用し、合成例 / 67 と同様に

反応を行い、融点 $146\sim 147^{\circ}\text{C}$ の結晶として、1,3-ジメチル-3-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)尿素を得る。収率58.3%。

合成例183

1-メチル-1-ブチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素とヨウ化メチルを使用し、合成例171と同様に反応を行い、沸点 $130\sim 135^{\circ}\text{C}$ (浴温) $/0.25\text{mmHg}$ の油状物として、1,3-ジメチル-1-ブチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素を得る。

合成例184

1-メチル-1-ブチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素とヨウ化エチルを使用し、合成例171と同様に反応を行い、沸点 $130\sim 135^{\circ}\text{C}$ (浴温) $/0.25\text{mmHg}$ の油状物として、1-メチル-1-ブチル-3-エチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素を得る。

合成例185

として、1,1-ジメチル-3-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)尿素の47.35gを得る。収率56%。

合成例187

3-メチルアミノ-5-1-ブチルイソオキサゾールを使用し、合成例186と同様に反応を行い、融点 $90\sim 91.0^{\circ}\text{C}$ の結晶として、1,1,3-トリメチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素を得る。

合成例188

3-アミノ-5-メチルイソオキサゾール100gに99%酢酸47.0gを加え、かきまぜながら1時間還流させる。反応液から酢酸を減圧除去し、残液に水50mlを加え、析出した結晶を回収する。この結晶を水洗し、減圧乾燥し、3-ホルミルアミノ-5-メチルイソオキサゾール120.6gを得る。本品をメタノールより再結晶し、融点 $130.5\sim 131.0^{\circ}\text{C}$ の結晶を得る。

合成例189 197

上記の原料物質(II)を使用し、合成例188と

1-エチル-1-ブチル-3-(5-メチル-3-イソオキサゾリル)尿素とヨウ化メチルを使用し、合成例171と同様に反応を行い、沸点 $140\sim 145^{\circ}\text{C}$ (浴温) $/0.67\text{mmHg}$ の油状物として、1-エチル-1-ブチル-3-メチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素を得る。

合成例186

3-アミノ-5-メチルイソオキサゾール49.06gにピリジン3gと塩化ジメチルカルバモイル1.18gを加え、 60°C にて5時間かきまぜる。ピリジンを減圧下に留去し、残液に水15mlと5%塩酸を加えて抽出とし、クロロホルムで抽出する。クロロホルム抽出液よりクロロホルムを留去し、残液に15%メタノール性水酸化ナトリウム液25mlを加え、蒸留を留去する。残液をクロロホルムで再抽出し、クロロホルム層は水洗し、芒硝で乾燥したのちクロロホルムを留去する。残液をシリカゲルの薄層クロマトグラフィーにて精製し、融点 $150.5\sim 151.5^{\circ}\text{C}$ の結晶

同様に反応を行い、対応する目的物質(1R)を得る：



表6

合成例No.	II		目的物質(1R) mp, bpまたはl. R
	R	X	
189	H	H	104-105
190	Me	H	130.5-131.0
191	Et	H	67-69
192	Pr	H	84.5-85.5
193	i-Pr	H	125-134 $^{\circ}\text{C}$ (浴温) $/04-042\text{mmHg}$
194	t-Bu	H	130-140 $^{\circ}\text{C}$ (浴温) $/073-074\text{mmHg}$
195	i-Pr	H	92.3-93.3
196	Ph	H	132-133
197	(CH ₂) ₆	H	152-166 $^{\circ}\text{C}$ (浴温) $/069-065\text{mmHg}$

注) 略号は前記と同意義を有する。

合成例198

3-アミノ-5-1-ブチルイソオキサゾール28.0gに無水酢酸6mlを加え、室温に4時間放置する。反応液に冷水50mlを加え、析出した結

晶を浮取する。この結晶を水洗し、乾燥し、3-アセチルアミノ-5-1-ブチルイソキサゾール3399を得る。本品をヘキサンより再結晶し融点120.5~121.0℃の結晶を得る。

合成例199-203

下記の原料物質(II)を使用し、合成例198と同様に反応を行い、対応する目的物質(1R)を得る：




表7

合成例	II			目的物質(1R)	
	R	X	R'	R ²	mp, bpまたはIR
199	Me	H	Me	-COCH ₃	88-92°C/0.95mmHg
200	t-Bu	H	H	-COCF ₃	145.0-145.5
201	t-Bu	H	H	-COCF ₂ CF ₃	103.0-104.0
202	t-Bu	H	Me	-COCH ₂ Me	111-116°C(浴温)/0.45mmHg
203	Me	Cl	H	-COCH ₃	122.0-122.5

注) 略号は前記と同意義を有する。

合成例204

3-アミノ-5-1-ブチルイソキサゾールをベンゼンに溶解し、これに塩化ベンゾイルとピリジンを加えて反応せしめ、融点192~193℃の結晶として3-ベンゾイルアミノ-5-1-ブチルイソキサゾールを得る。

合成例205-208

下記の原料物質(II)を使用し、合成例204と同様に反応を行い、対応する目的物質(1R)を得る：



表8

合成例	II			目的物質(1R)	
	R	X	R'	R ²	mp, bpまたはIR
205	t-Bu	H	H	-COCH ₂ Cl	105.5-106.5
206	t-Bu	H	H	-COCHCl ₂	124.0-125.0
207	t-Bu	H	H	-CO-t-Bu	174.5-175.5
208	t-Bu	H	i-Pr	-COCH ₂ Cl	168.6, 158.5cm ⁻¹ (CCl ₄)

注) 略号は前記と同意義を有する。

合成例209

1-メチル-3-(5-1-ブチル-3-イソキサゾリル)尿素1979をピリジン30mlに溶解し、-30~-40℃に冷却下塩化ブチルスルフェニル1.359を加える。混合物を-30~-40℃で6時間、さらに室温で一晩放置する。反応液を常法により処理したのちシリカゲルを使用してカラムクロマトグラフィーに付し、油状物として1-メチル-1-ブチルチオ-3-(5-1-ブチル-3-イソキサゾリル)尿素の0.319を得る。IR/698, 1606cm⁻¹(CCl₄)。

合成例210

1-メチル-3-(5-メチル-3-イソキサゾリル)尿素を使用し、合成例209と同様に反応を行い、油状物として1-メチル-1-ブチルチオ-3-(5-メチル-3-イソキサゾリル)尿素を得る。IR/693, 1618cm⁻¹(CCl₄)。

合成例211

5-1-ブチル-3-イソキサゾリルカルバ

ミン酸メチルエステル2009と無水酢酸ナトリウム0919を氷酢酸5mlに溶解した溶液に臭素2009を加える。これを70℃にて3/時間攪拌し、無水酢酸を加え、氷水50mlに注加し、塩化メチレンにて抽出する。有機層を炭酸水素ナトリウムの飽和水溶液と水で順次洗浄し、減圧濃縮して溶媒を留去する。油状物として4-ブromo-5-1-ブチル-3-イソキサゾリルカルバミン酸メチルエステル2779を得る。IR/774, 1203cm⁻¹(CCl₄)。

合成例212

1,1-ジメチル-3-(5-1-ブチル-3-イソキサゾリル)尿素を使用し、合成例211と同様に反応を行い、融点164.5~165.5℃の結晶として1,1-ジメチル-3-(4-ブromo-5-1-ブチル-3-イソキサゾリル)尿素を得る。

合成例213

イソファン酸3-イソキサゾリルエステルを使用し、合成例87と同様に反応を行い、油状物

として1-メトキシ-1-メチル-3-(3-イソオキサゾリル)尿素を得る。I.R./7/7、 $1575\text{ cm}^{-1}(\text{CCl}_4)$ 。

合成例2/4

1,1-ジメチル-3-(4,5,6-7-テトラヒドロ-1,2-ベンズイソオキサゾール-3-イル)尿素を使用し、合成例1/7と同様に反応を行い、沸点 $1380\sim 1390^\circ\text{C}/0.58\text{ mmHg}$ の油状物として1,1,3-トリメチル-3-(4,5,6-7-テトラヒドロ-1,2-ベンズイソオキサゾール-3-イル)尿素を得る。

これらイソオキサゾール化合物(1)は各種雑草に対して少量の使用量にて優れた除草活性を示すが、使用濃度を変更し非選択性除草剤として、また選択性除草剤として使用してもよい。本発明にかかる除草剤が一般的に使用できる対象作物としては、小麦、大麦、トウモロコシ、ニンジン、ツツセイ、豆類、水稻などが例示される。また特に作物植付後に使用できる場合としては、サトウキビ、パレイシヨ、カンシヨ、ハツカ、ナス、ビ

ーマンなどが例示される。これらの作物に対する本発明の除草剤による被害はほとんど皆無であるか、極めて軽微であつて容易に回復できる程度である。また人や家畜類には無害安全であり、さらに魚貝類に対する毒性も極めて低い。従つて本発明の除草剤は極めて安全性が高く、土壌中残留性も適当な薬剤群である。

本発明のイソオキサゾール化合物(1)は、N位活性水素が存在しているときには製剤化あるいは安定性の向上などの必要性如何により、その適当なアルカリ金属塩またはアルカリ土類金属塩として使用してもよい。

本発明にかかる除草剤は、有効成分としての上記化合物(1)に適当な固体または液体の不活性担体を混合して使用されるが、必要によりさらに補助剤(例えば、乳化剤、安定剤、分散剤、懸濁剤、展着剤、浸透剤、湿剤)を加して、所望の剤型(例えば、乳剤、水和剤、顆粒剤、粉剤、粒剤)に調製して使用すればよい。担体としては、クレー、クルク、けい酸土、ペントナイトなどの固

形担体、水、アルコール類、アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフサ、シクロヘキサンなどの液状担体が挙げられる。

なお本発明の除草剤は殺虫剤、殺菌剤、他の除草剤などの農薬、葉面肥、尿素などの肥効成分、あるいは土壌処理剤などと混合して使用することもできる。

以下に試験例を挙げて本発明の除草剤についてその除草活性を示す。

試験例 1

1) 供試化合物

化合物名 化合物名

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | 1-メチル-3-(5-エチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 2 | 1-メチル-3-(5-イソプロピル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 3 | 1-メチル-3-(5-イソブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 4 | 1-メチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |

- | | |
|----|---|
| 5 | 1-メチル-3-(5-シクロプロピル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 6 | N-(5-イソブチル-3-イソオキサゾリル)カルバミン酸メチルエステル |
| 7 | N-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)カルバミン酸メチルエステル |
| 8 | N-(5-シクロプロピル-3-イソオキサゾリル)カルバミン酸メチルエステル |
| 9 | 1,1-ジメチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 10 | 1,3-ジメチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 11 | 1,1,3-トリメチル-3-(5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |
| 12 | 1,3-ジメチル-3-(4-クロロ-5-1-ブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 |

13 1-ノチル-1-ブチル-3-(5-
1-ブチル-3-イソオキサゾリル)
尿素

14 1-エチル-3-(5-1-ブチル-
3-イソオキサゾリル)尿素

15 1-ブチル-3-(5-1-ブチル-
3-イソオキサゾリル)尿素

16 1-アリル-3-(5-1-ブチル-
3-イソオキサゾリル)尿素

17 PCP-Na (ナトリウム・ペンタクロロ
フェノキシド)

b) 試験方法

① 発芽前処理試験

試験植物の種子25粒を直径9cmの砂壤土をつめたポリエチレンカップに種類別に播種した。播種後約5cmの厚さの覆土を行い、ただちに供試化合物の水性懸濁液(展着剤としてツイーン20の100 ppm相当を使用)を土壌表面に散布した。供試化合物の使用量はアール当りで10gおよび30gとし、また散布液の稀釈水量はアール当り

10gとし、クロマトスプレーで散布した。管理は25℃、自然日照の屋内で行った。薬剤処理後3週間目に発芽度を検定した。

② 発芽後処理試験

試験植物の播種後10日目の幼植物に、発芽前処理試験と同様の方法で、供試化合物について処理を行った。管理および検定も上記の方法と同様に行った。

c) 評価方法

試験結果は、各処理後に肉眼観察を行なうとともに、3週間後における生存個体数によって生存率を算出し、次のような6段階評価を行って表示した。

試験植物の生存率10%以下	5
- 11~25%	4
- 26~50%	3
- 51~75%	2
- 76~90%	1
- 91%以上	0

(以下余白)

d) 結果

表6

化合物 No.		除 草 作 用												
		発芽前処理試験						発芽後処理試験						
		用量	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	2	
2	10	0	1	3	5	3	5		0	1	1	5	4	5
	30	0	3	4	5	3	5		0	4	4	5	5	5
3	10	0	0	0	2	0	0		0	0	0	5	3	2
	30	0	0	0	3	1	0		0	0	0	5	4	4
4	10	0	2	5	4	5	5		0	5	5	5	5	5
	30	0	3	5	5	5	5		0	5	5	5	5	5
5	10	0	0	0	1	0	0		0	0	1	5	4	5
	30	0	0	0	4	1	4		0	0	2	5	5	5
6	10	0	0	0	1	0	1		0	0	0	5	1	0
	30	0	0	0	1	0	1		0	0	0	5	1	0
7	10	0	0	2	4	3	2		0	0	3	5	5	3
	30	0	2	3	5	5	5		0	0	4	5	5	5

8	10	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5	2	3
	30	0	0	2	5	3	3	0	0	0	5	4	5
9	10	1	5	4	5	5	5	0	5	5	5	5	5
	30	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5
10	10	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5
	30	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5
11	10	0	2	4	5	5	3	0	4	5	5	5	5
	30	0	3	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5
12	10	0	0	0	5	5	5	0	2	4	5	5	5
	30	0	1	2	5	5	5	0	1	4	5	5	5
13	10	0	3	4	5	5	5	0	5	5	5	5	5
	30	1	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5
14	10	0	0	0	1	1	4	0	1	1	0	3	4
	30	0	1	2	4	3	5	0	1	3	1	3	5
15	10	0	0	0	3	1	5	0	1	1	5	0	5
	30	0	0	0	4	2	5	0	1	1	5	5	5
16	10	0	0	1	2	1	2	0	3	2	5	3	5
	30	0	4	2	5	1	4	0	2	3	5	5	4
17	10	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	2	5
	30	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	4	5
	50	0	2	2	0	5	5	0	0	4	2	5	5

注) 用量は g/a を単位とし、表中の記号は次の意義を有する: A. コムギ; B. イヌエビ; C. メヒシバ; D. ナタネ; E. イヌタデ; F. アオビユ。

本発明の化合物(化合物 No. 1~16)はいずれもコムギに対する雑草作用はほとんどないが、イヌエビ、メヒシバ、ナタネ、イヌタデまたはアオビユに対して優れた選択的殺草作用を示し、市販の除草剤である PCP-Na (化合物 No. 17) よりもはるかに強力である。

試験例 2

1-メチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素を懸濁液として用い、圃場条件における発芽後茎葉処理を行ない殺草効果を調べた。使用量アールあたり 10~30 g の範囲で次の雑草が除草できた。

タカサブロウ、ノボロギク、ツルソバ、ハコベ、ウシハコベ、ザクロソウ、スカシタゴボウ、シロザ、ミミナグサ、スベリヒユ、ヤエムグサ、スズメノテツボウ、コニシキソウ、キウリグサ、コゴ

録商標: 花王石鹼株式会社製) 5 重量部とを混合粉砕して水和剤とする。

実施例 3

1-1-ジメチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 20 重量部をジメチルホルムアミド 65 重量部に溶解し、これにソルボール 800 (登録商標: 東邦化学工業株式会社製) 15 重量部を加えて乳剤とする。

実施例 4

1-1-ジメチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 10 重量部、ソルボール (登録商標: 東邦化学工業株式会社製) 10 重量部、シクロヘキサノン 20 重量部およびソルベントナフサ 40 重量部を混合溶解して乳剤とする。

実施例 5

1-1-ジメチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 50 重量部、リグニンスルホン酸カルシウム 3 重量部、ソルボール (登録商標: 東邦化学工業株式会社製) 3 重量部および界面活性剤 44 重量部を粉砕混合して水和剤とする。

メノカヤツリ、エノコログサ、ツメクサ、ノミノフスマ、カラスビシャク、イヌガシラ、トキワハゼ、ハハコグサ、ムラサキカタバミ、ジレバリ、ヨモギ、ヒルガオ、クンボボ、アザミ、フキ、ワラビ、スズメノトウガラシ、チヨウジタデ、ヒルムシロ、マツバイ。

試験例 3

1-メチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素の魚毒性を、市販の PCP-Na と対比して、ヒメダカについて検討したところ、極めて低いものであった。

以下に本発明の除草剤の実施例を挙げる。

実施例 1

1-1-ジメチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 10 重量部を微粉タルク 90 重量部と均一に混合し、粉剤とする。

実施例 2

1-ブチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 20 重量部、クレ-50 重量部、タルク 25 重量部および湿潤剤エマル (登録

実施例 6

1-1-ジメチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 5 重量部およびクレ-95 重量部を粉砕混合して粉剤とする。

実施例 7

1-ブチル-1-メチル-3-(5-ヒューブチル-3-イソオキサゾリル)尿素 5 重量部、リグニンスルホン酸カルシウム 5 重量部、ペントナイト 30 重量部およびクレ-60 重量部を粉砕混合し、水を加えて練合し、造粒し、乾燥して粒剤を得る。

特許出願人 堀野製薬株式会社

代理人 弁理士 岩崎 光隆